



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública

Centre de Salut Pública d'Alcoi

Av. Alameda Camilo Sesto, 41-03803 Alcoi

Tif. 96 6528000 - email: csp_alcoi@gva.es

www.sp.gva.es/cspalcoi

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EL CONTROL DE TRANSMISIÓN DE LA TOSFERINA

Se ha detectado un incremento de casos de tosferina que están ocurriendo fundamentalmente en población escolar en el municipio de Alcoi.

La tosferina es una enfermedad muy contagiosa, especialmente entre personas que no han sido inmunizadas o no han tenido un primer contacto con la bacteria. Su período de incubación es en promedio de 9 a 10 días y su transmisión es por vía respiratoria.

La enfermedad se manifiesta por la aparición de síntomas similares a los de un catarro común, que al cabo de 2 a 4 semanas evolucionan a una tos que aumenta progresivamente. En adolescentes y adultos suele ser una enfermedad benigna, siendo los menores de 6 meses la población más vulnerable al no haber completado aún la pauta de vacunación y en los que se pueden observar las principales complicaciones. El enfermo de tosferina deja de ser transmisible a los cinco días del comienzo del tratamiento antibiótico adecuado.

Desde Salud Pública y Atención Primaria se están llevando a cabo coordinadamente las actividades necesarias para reforzar la vigilancia de esta enfermedad y orientar las medidas para su prevención y control.

- Aislamiento respiratorio y tratamiento específico con antibióticos de los casos confirmados.
- Identificación y profilaxis de sus contactos estrechos.
- Revisión y actualización si procede del calendario vacunal frente a tosferina de los contactos estrechos.

Adicionalmente, y de forma transitoria mientras se mantenga la actual situación epidemiológica, para proteger a la población más vulnerable es recomendable la adopción de medidas no farmacológicas entre los contactos estrechos como:

- Utilización de mascarillas en la población mayor de 6 en locales cerrados.
- Utilización de pañuelos desechables.
- Lavado frecuente de manos y siempre después de toser/estornudar.

Es conveniente recordar que la utilización de la mascarilla es una herramienta fundamental en el control de la transmisión de enfermedades infecciosas por vía respiratoria.

Implementando estas medidas sencillas, se contribuye a reducir la transmisión en entornos cerrados, protegiendo así la salud de la comunidad, permitiendo un ambiente más seguro y saludable para todos.



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Sanidad

Centre de Salut Pública d'Alcoi

Unitat d'Informació i Vigilància Epidemiològica

Av. Alameda Camilo Sesto, 41-03803 Alcoi

966 528 000 · csp_alcoi@gva.es

www.sp.gva.es/cspalcoi