

CEIP ALMADRABA

A/A Padre/Madre/Tutor
Alumnos INF 5ª AI

Ante la aparición de dos casos de **escarlatina** entre los alumnos del aula a la que acude su hijo/a les informamos de lo siguiente:

La escarlatina es una de las varias enfermedades que puede causar una bacteria llamada *Streptococo Pyogenes*, que se transmite fundamentalmente a través de gotas de saliva que se emiten al hablar, toser, estornudar o bien por contacto con las secreciones de nariz y/o garganta de una persona infectada. En ambientes cerrados con mucho contacto entre las personas, como sucede en las clases con niños pequeños, se puede transmitir con más facilidad.

La infección por el estreptococo NO implica necesariamente la aparición de una enfermedad, ya que hay personas que son portadoras sanas del germen en su nariz y/o garganta y éstas pueden transmitir la infección a otras personas.

La escarlatina se caracteriza por una erupción rojiza y punteada de la piel que afecta principalmente al cuello, tronco, axilas, ingles y cara interna de los muslos, se acompaña en ocasiones de malestar general, fiebre de comienzo repentino, faringitis y/o amigdalitis y además puede aparecer la llamada “lengua de frambuesa”. Todas estas manifestaciones no tienen por qué aparecer a la vez y suelen variar de unas personas a otras.

El tratamiento de la escarlatina se realiza con antibióticos, habitualmente derivados de la Penicilina, y suele curar por completo, reduciendo además el riesgo de desarrollar complicaciones posteriores. En caso de alergia deberá consultar con su médico o pediatra. Por tanto, los enfermos, si no tienen síntomas que lo impidan pueden reincorporarse al centro después de 24 horas de haber iniciado el tratamiento antibiótico apropiado, ya que prácticamente se habrá interrumpido la posibilidad de contagiar.

Si piensa que alguien de su familia o contactos estrechos padece alguno de los síntomas de la escarlatina **debe acudir a su médico de cabecera o pediatra tan pronto como sea posible y seguir el tratamiento antibiótico que le indique**. Deberá permanecer en casa, sin acudir a la guardería, colegio o trabajo, al menos 24 horas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico para evitar la transmisión de la enfermedad.

Fdo. Mariam Pascual del Pobil
Médico de Salud Pública – Sección Epidemiología
Centro de Salud Pública de Alicante





