

Mar, platges i dunes



Gaviota cabecinegra
Gavina capnegra
Larus melanocephalus



Gaviota picofina
Gavina capblanca
Larus genei



Gaviota de Audouin
Gavina corsa
Larus audouinii



Pardela balear
Baldriga balear
Puffinus mauretanicus



Charrán patinegro
Xatrac beclarg
Sterna sandvicensis



Gaviota picofina
Gavina capblanca
Larus genei



Gaviota de Audouin
Gavina corsa
Larus audouinii



Chorlitejo patinegro
Corriol camanegre
Charadrius alexandrinus



Cernícalo vulgar
Soliguer
Falco tinnunculus

El frente litoral de l'Albufera se extiende desde la desembocadura del río Turia hasta el cabo de Cullera. Presenta playas arenosas que en algunos tramos todavía conservan sistemas de dunas en su parte más alta. La escasa pendiente de las playas condiciona un mar somero cuyas aguas se enriquecen por el aporte de nutrientes a través de las cuatro golgas de desagüe de l'Albufera, susten-tando una rica comunidad animal.



Charrán patinegro
Xatrac beclarg
Sterna sandvicensis



Gaviota picofina
Gavina capblanca
Larus genei



Gaviota de Audouin
Gavina corsa
Larus audouinii



Chorlitejo patinegro
Corriol camanegre
Charadrius alexandrinus



Cernícalo vulgar
Soliguer
Falco tinnunculus

El front litoral de l'Albufera s'estén des de la desem-bocadura del riu Túria fins al cap de Cullera. Hi ha platges arenoses que, en alguns trams, encara conserven sistemes de dunas a la part més alta. L'escassa pendent de les platges condiciona un mar somer amb aigua enriquida per l'aportació de nutrients a través de les quatre golges de desaigüe de l'Albufera, que sustenten una gran comunitat animal.



Charrán patinegro
Xatrac beclarg
Sterna sandvicensis



Gaviota picofina
Gavina capblanca
Larus genei



Gaviota de Audouin
Gavina corsa
Larus audouinii



Chorlitejo patinegro
Corriol camanegre
Charadrius alexandrinus



Cernícalo vulgar
Soliguer
Falco tinnunculus

Es una parte de la gran restinga litoral arenosa extendida entre la desembocadura del río Turia y el cabo de Cullera que separa l'Albufera del mar Mediter-ráneo. De unos 10 kilómetros de longitud, este espacio ha sido objeto de un extraordinario plan de restauración ambiental. Todavía conserva campos de dunas con una flora y fauna propias de arenales costeros, incluyendo una densa vegetación arbustiva mediterránea con una gran diversidad de especies.



Charrán patinegro
Xatrac beclarg
Sterna sandvicensis



Gaviota picofina
Gavina capblanca
Larus genei



Gaviota de Audouin
Gavina corsa
Larus audouinii




Chorlitejo patinegro
Corriol camanegre
Charadrius alexandrinus



Cernícalo vulgar
Soliguer
Falco tinnunculus

És una part de la gran restinga litoral arenosa estesa entre la desembocadura del riu Túria i el cap de Cullera, que separa l'Albufera del mar Mediterrani. D'uns 10 quilòmetres de longitud, este espai ha sigut objecte d'un extraordinari pla de restauració ambiental. Encara conserva camps de dunas amb una flora i fauna pròpies d'arenals costaners, incloent-hi una densa vegetació arbustiva mediterrània amb una gran diversitat d'espècies.




Charrán patinegro
Xatrac beclarg
Sterna sandvicensis



Gaviota picofina
Gavina capblanca
Larus genei



Gaviota de Audouin
Gavina corsa
Larus audouinii



Chorlitejo patinegro
Corriol camanegre
Charadrius alexandrinus



Cernícalo vulgar
Soliguer
Falco tinnunculus

Espacio de aguas dulces y poco profundas, de 3.000 hectáreas de extensión, que es parte de la laguna costera no transformada en arrozal. Recibe agua de los ríos Júcar y Turia y en las zonas más someras se desarrollan densos carrizales conocidos como mates. Los canales de desagüe al mar (goles) tienen compuertas que evitan la entrada del agua marina



Charrán patinegro
Xatrac beclarg
Sterna sandvicensis



Gaviota picofina
Gavina capblanca
Larus genei



Gaviota de Audouin
Gavina corsa
Larus audouinii



Chorlitejo patinegro
Corriol camanegre
Charadrius alexandrinus



Cernícalo vulgar
Soliguer
Falco tinnunculus

Espai d'aigua dolça i poc profunda, de 3.000 hectàrees d'extensió, que és part de la llacuna costanera no transformada en arrossar. Rep aigua dels rius Xúquer i Túria i a les zones més someres es formen densos senllars coneguts amb la denomina-ció de mates. Els canals de desaigüe al mar (goles) tenen comportes que eviten l'entrada de l'aigua marina.



Charrán patinegro
Xatrac beclarg
Sterna sandvicensis



Gaviota picofina
Gavina capblanca
Larus genei



Gaviota de Audouin
Gavina corsa
Larus audouinii



Chorlitejo patinegro
Corriol camanegre
Charadrius alexandrinus



Cernícalo vulgar
Soliguer
Falco tinnunculus

Representa el ambiente con mayor extensión del Parque Natural de l'Albufera, ocupando unas 14.000 hectáreas. Se trata de terrenos ganados a la laguna mediante la construcción de canales de drenaje y diques de contención. El agua de los ríos Júcar y Turia ha permitido dulcificar este ambiente para hacer posible el cultivo del arroz. Tras la cosecha estival el marjal permanece inundado.



Charrán patinegro
Xatrac beclarg
Sterna sandvicensis



Gaviota picofina
Gavina capblanca
Larus genei



Gaviota de Audouin
Gavina corsa
Larus audouinii



Chorlitejo patinegro
Corriol camanegre
Charadrius alexandrinus



Cernícalo vulgar
Soliguer
Falco tinnunculus

Representa l'ambient amb major extensió del Parc Natural de l'Albufera, que ocupa unes 14.000 hectàrees. Es tracta de terrenys guanyats a la llacuna mitjançant la construcció de canals de drenatge i dics de contenció. L'aigua dels rius Xúquer i Túria ha permès endolcir este ambient per a fer-hi possible el cultiu de l'arròs. Després de la collita estival, la marjal està inundada.