

GRUPS DE RISC

Grups de risc en etapes escolars amb prioritat per a la vacunació, que poden rebre la vacuna antigripal inhalada en l'àmbit escolar

- **Malaltia respiratòria crònica** (p. ex. bronquièctasi, asma¹, hiperreactivitat bronquial) en situació estable, sense compromís respiratori.
- **Obesitat** mòrbida (IMC \geq +3 desviacions estàndard)
- **Malaltia celíaca**
- Fístula d'LCR
- Desnutrició moderada
- Malaltia neuromuscular crònica i encefalopatia moderada o greu².
- **Implant coclear** (o en espera d'este)
- Síndrome de Down i altres trastorns genètics amb factors de risc²
- Malaltia cardiovascular (inclosa HTA aïllada)²
- Malaltia metabòlica crònica (p. ex. diabetis mellitus, errors congènits del metabolisme, etc.)²
- Malaltia crònica renal o hepàtica²
- Malaltia inflamatòria intestinal crònica²
- Malalties reumàtiques²
- Xiquets institucionalitzats o tutelats per l'Administració²

¹ Els xiquets amb asma lleu o moderada, estables, sense crisis de broncoespasme en les últimes 48 hores, poden rebre la vacuna inhalada.

² Comprovar en la història clínica del pacient i en el full d'autorització dels pares que no estiga rebent cap tractament que pugua comprometre la seua immunitat i contraindique la vacunació inhalada.

Grups de risc en etapes escolars amb prioritat per a la vacunació, en els quals està **CONTRAINDICADA la vacuna antigripal inhalada (han de ser vacunats amb la vacuna intramuscular en el seu centre de salut o en l'hospital)**

- Anafilàctica documentada a qualsevol ingredient de la vacuna, excepte a l'ou, o a una dosi prèvia de vacuna contra la grip.
- **Immunocompromesos** (a excepció de xiquets amb infecció per VIH estable que reben teràpia antiretroviral i amb una funció immunitària adequada):
 - Asplènia funcional o anatòmica
 - Malaltia oncològica
 - Malaltia hematològica moderada o greu (p. ex. hemoglobinopatia amb repercussió clínica, que requerisca hemoderivats o transfusions, i trastorns hemorràgics crònics)
 - Immunodeficiència congènita (exclòs el dèficit aïllat asimptomàtic d'IgA) o adquirida (inclou infecció VIH, corticoides sistèmics en dosis altes i mantingudes, fàrmacs immunosupressors, eculizumab o ravulizumab i receptors de trasplantaments)
- **Compromís de la funció respiratòria** i la gestió de secrecions (traqueostomia, ventilació mecànica); seqüeles de casos greus de COVID-19.
- Xiquets **convivents amb persones que tinguen immunosupressió greu**.
- Xiquets que reben **àcid acetilsalicílic** o teràpia que en continga, a causa de l'associació amb la síndrome de Reye.