

## GRUPS DE RISC

### Grups de risc en etapes escolars amb prioritat per a la vacunació, que poden rebre la vacuna antigripal inhalada en l'àmbit escolar

- **Malaltia respiratòria crònica** (p. ex. bronquièctasi, asma<sup>1</sup>, hiperreactivitat bronquial) en situació estable, sense compromís respiratori.
- **Obesitat** mòrbida (IMC  $\geq +3$  desviacions estàndard)
- **Malaltia celíaca**
- Fístula d'LCR
- Desnutrició moderada
- Malaltia neuromuscular crònica i encefalopatia moderada o greu<sup>2</sup>.
- **Implant coclear** (o en espera d'este)
- Síndrome de Down i altres trastorns genètics amb factors de risc<sup>2</sup>
- Malaltia cardiovascular (inclosa HTA aïllada)<sup>2</sup>
- Malaltia metabòlica crònica (p. ex. diabetis mellitus, errors congènits del metabolisme, etc.)<sup>2</sup>
- Malaltia crònica renal o hepàtica<sup>2</sup>
- Malaltia inflamatòria intestinal crònica<sup>2</sup>
- Malalties reumàtiques<sup>2</sup>
- Xiquets institucionalitzats o tutelats per l'Administració<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Els xiquets amb asma lleu o moderada, estables, sense crisis de broncoespasme en les últimes 48 hores, poden rebre la vacuna inhalada.

<sup>2</sup> Comprovar en la història clínica del pacient i en el full d'autorització dels pares que no estiga rebent cap tractament que puga comprometre la seu immunitat i contraindique la vacunació inhalada.

### Grups de risc en etapes escolars amb prioritat per a la vacunació, en els quals està CONTRAINDICADA la vacuna antigripal inhalada (han de ser vacunats amb la vacuna intramuscular en el seu centre de salut o en l'hospital)

- Anafilàctica documentada a qualsevol ingredient de la vacuna, excepte a l'ou, o a una dosi prèvia de vacuna contra la grip.
- **Immunocompromesos** (a excepció de xiquets amb infecció per VIH estable que reben teràpia antiretroviral i amb una funció immunitària adequada):
  - Asplènia funcional o anatòmica
  - Malaltia oncològica
  - Malaltia hematològica moderada o greu (p. ex. hemoglobinopatia amb repercussió clínica, que requereix hemoderivats o transfusions, i trastorns hemorràgics crònics)
  - Immunodeficiència congènita (exclòs el déficit aïllat asimptomàtic d'IgA) o adquirida (inclou infecció VIH, corticoides sistèmics en dosis altes i mantingudes, fàrmacs immunosupressors, eculizumab o ravulizumab i receptors de trasplantaments)
- **Compromís de la funció respiratòria** i la gestió de secrecions (traqueostomia, ventilació mecànica); seqüeles de casos greus de COVID-19.
- Xiquets **convivents** amb persones que tinguen **immunosupressió greu**.
- Xiquets que reben **àcid acetilsalicílic** o teràpia que en continga, a causa de l'associació amb la síndrome de Reye.

## GRUPOS DE RIESGOS

### **Grupos de riesgo en etapas escolares con prioridad para la vacunación, que pueden recibir la vacuna antígrupal inhalada en el ámbito escolar**

- **Enfermedad respiratoria crónica** (p. ej. bronquiectasias, asma<sup>1</sup>, hiperreactividad bronquial), en situación estable, sin compromiso respiratorio.
- **Obesidad mórbida** (IMC  $\geq +3$  desviaciones estándar)
- **Enfermedad celiaca**
- Fístula del LCR
- Desnutrición moderada
- Enfermedad neuromuscular crónica y encefalopatía moderada o grave<sup>2</sup>.
- **Implante coclear** (o en espera del mismo)
- Síndrome de Down y otros trastornos genéticos con factores de riesgo<sup>2</sup>
- Enfermedad cardiovascular (incluida la HTA aislada)<sup>2</sup>
- Enfermedad metabólica crónica (p. ej. diabetes mellitus, errores congénitos del metabolismo, etc.)<sup>2</sup>
- Enfermedad crónica renal o hepática<sup>2</sup>
- Enfermedad inflamatoria intestinal crónica<sup>2</sup>
- Enfermedades reumáticas<sup>2</sup>
- Niños institucionalizados o tutelados por la Administración<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Los niños con asma leve o moderada, estables, sin crisis de broncoespasmo en las últimas 48 horas, pueden recibir la vacuna inhalada.

<sup>2</sup>Comprobar en la historia clínica del paciente y en la hoja de autorización de los padres que no esté recibiendo ningún tratamiento que pueda comprometer su inmunidad y contraindique la vacunación inhalada.

### **Grupos de riesgo en etapas escolares con prioridad para la vacunación, en los que está CONTRAINDICADA la vacuna antígrupal inhalada (deben ser vacunados con la vacuna intramuscular en su centro de salud o en el hospital)**

- Anafiláctica documentada a cualquier ingrediente de la vacuna, excepto al huevo, o a una dosis previa de vacuna contra la gripe.
- **Inmunocomprometidos** (a excepción de niños con infección por VIH estable que reciben terapia antirretroviral y con una función inmunitaria adecuada):
  - Asplenia funcional o anatómica
  - Enfermedad oncológica
  - Enfermedad hematológica moderada o grave (p. ej. hemoglobinopatía con repercusión clínica, que requiera hemoderivados o transfusiones, y trastornos hemorrágicos crónicos)
  - Inmunodeficiencia congénita (excluido el déficit aislado asintomático de IgA) o adquirida (incluye infección VIH, corticoides sistémicos a dosis altas y mantenidas, fármacos inmunosupresores, eculizumab o ravulizumab y receptores de trasplantes)
- **Compromiso de la función respiratoria** y el manejo de secreciones (traqueostomía, ventilación mecánica); secuelas de casos graves de COVID-19
- **Niños convivientes con personas que tengan inmunosupresión grave.**
- Niños que reciben **ácido acetilsalicílico** o terapia que lo contiene, debido a la asociación con el síndrome de Reye.