

	VACUNACIÓ COVID-19 EN POBLACIÓ INFANTIL DE 5 A 11 ANYS	Data: 09/12/2021
---	---	---------------------

FULL INFORMATIU

La Comissió de Salut Pública ha acordat la vacunació en la població infantil de 5 a 11 anys, considerant que disminuiria la càrrega de malaltia en aquest col·lectiu i que pot disminuir la transmissió en l'entorn familiar, en els centres educatius i en la comunitat, i contribuiria a la protecció de les poblacions més vulnerables.

Beneficis de la vacunació

L'autorització de les vacunes contra la COVID-19 implica que els beneficis d'administrar-la superen àmpliament els riscos coneguts. Els assajos clínics practicats han demostrat que la vacuna en aquestes edats té una efectivitat alta, i supera el 90 % després de la 2a dosi. Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de la 1a dosi, encara que com qualsevol altra vacuna pot ser que no protegisca totalment totes les persones vacunades.

S'utilitzarà vacuna d'ARNm. Actualment, per a aquesta edat, a Europa només està autoritzada la vacuna de Pfizer-Comirnaty®.

La pauta de vacunació consisteix en l'administració de dues dosis de vacuna pediàtrica separades per 8 setmanes. Aquesta separació entre dosis és major que la que recull la fitxa tècnica perquè els estudis en països que ja estan vacunant a aquestes edats han demostrat que amb aquest interval l'efectivitat és més alta i els efectes adversos greus són menys freqüents.

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la reb. L'administració reduirà la probabilitat d'emmalaltir, desenvolupar una malaltia greu i morir. No obstant això, les persones vacunades hauran de continuar adoptant les mesures preventives per a reduir la transmissió.

Reaccions adverses o efectes secundaris

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se, són generalment lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions s'inclouen: sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d'injecció, fatiga, mal de cap, muscular i d'articulacions, febre o calfreds, diarrea i nàusees. Molt rarament s'han descrit miocarditis o pericarditis associades a la vacunació.

Durant un mínim de 15 minuts després de la vacunació, s'observarà si apareix alguna de les possibles reaccions adverses.

Què fer en cas d'una reacció adversa o efecte secundari

Si després de vacunar apareix algun dels efectes lleus enumerats en l'apartat anterior, pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com ara paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense que això influïska en la resposta immune. Si és necessari, es pot consultar el personal sanitari, especialment si la persona vacunada presenta dificultat per a respirar, palpitations o dolor al pit.

Si la reacció és lleu, també pot notificar-la de manera electrònica a través de l'adreça web <https://www.notificaram.es> o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de l'apartat d'enllaços d'interés.

	VACUNACIÓ COVID-19 EN POBLACIÓ INFANTIL DE 5 A 11 ANYS	Data: 09/12/2021
---	---	---------------------

Vacunació en els centres educatius

Aquesta organització permet una vacunació més ràpida i eficient i una cobertura millor, fet que és d'importància especial en una situació d'incidència a l'alça i nombrosos brots en l'àmbit escolar. Els equips de vacunació compten amb tot el necessari perquè la vacunació en aquests centres siga tan segura com si es practicara en el centre de salut.

Se sol·licita autorització de mares / pares / tutors legals per a la vacunació. No es vacunarà cap persona que no dispose d'aquesta.

Informe de vacunació

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per l'accés i la descàrrega 24 hores després del registre de la vacunació. Aquest informe podrà descarregar-se des del web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb les dades de la targeta SIP (<http://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio>).

Si requereix el Certificat COVID Digital de la UE, pot obtindre'l en l'enllaç següent: <https://coronavirus.san.gva.es/certificado-digital-ue>

	VACUNACIÓ COVID-19 EN POBLACIÓ INFANTIL DE 5 A 11 ANYS	Data: 09/12/2021
---	---	---------------------

QÜESTIONARI I AUTORITZACIÓ PER A EMPLENAR

SÍ/NO (*)	QÜESTIONARI DE LA PERSONA QUE CAL VACUNAR	MESURES QUE CAL ADOPTAR
	Ha patit una reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies de vacunes o algun dels seus components (incloent-hi polietilenglicol)?	Contraindicació absoluta
	Ha passat la COVID-19, amb símptomes o sense, en les últimes 4 setmanes?	Cal ajornar la vacunació fins que passen 4 setmanes des del diagnòstic.
	Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febra > 38 °C?	Cal ajornar la vacunació.
	Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?	Valorar per professionals sanitaris.
	Ha rebut alguna vacuna recentment o ha de rebre-la pròximament?	No és necessari separar la vacuna contra la COVID-19 d'altres vacunes prèvies o simultànies.
	Pateix immunosupressió?	Cal vacunar igualment. La resposta immune pot ser inferior.
	Està rebent tractaments contra la COVID-19 (plasma de convalescents, anticossos monoclonals o antivírics)?	Cal ajornar la vacunació 90 dies.
	Està rebent tractament crònic amb anticoagulants?	Valorar per professionals sanitaris.
	Quina edat té?	Es recomana la vacunació entre 5 i 11 anys complits.

(*) Indicar SÍ o NO en cadascuna de les preguntes del qüestionari, excepte en l'última en la qual s'ha de posar l'edat.

	<h2>VACUNACIÓ COVID-19 EN POBLACIÓ INFANTIL DE 5 A 11 ANYS</h2>	Data: 09/12/2021
---	---	---------------------

AUTORITZACIÓ PER A LA VACUNACIÓ CONTRA LA COVID 19 EN L'ÀMBIT EDUCATIU

Sr./Sra.(**) _____,
 amb DNI _____, com a mare/pare/ tutor o representant legal del Sr. / de la Sra.
 _____, amb núm. de SIP
 _____, i data de naixement ___ / ___ / ___ (dia/ mes /any).

Després d'haver llegit el full informatiu:

Autoritze que se li administre la vacuna contra la COVID 19.

No autoritze que se li administre la vacuna contra la COVID 19.

Poden ser motius de no autorització: reaccions al·lèrgiques greus o immediata a dosis prèvies de vacunes o algun dels seus components (contraindicació absoluta); haver passat la COVID (amb símptomes o sense en les últimes 4 setmanes); patir alguna malaltia aguda moderada o greu o febre de més de 38°; haver tingut una reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables; estar rebent tractament contra COVID-19; estar rebent tractament crònic amb anticoagulants o el rebuig a la vacunació.

Data: ___ / ___ / ___

Signatura

(**) En les situacions de separació, divorci, nul·litat, ruptura de parelles i situacions anàlogues l'autorització haurà d'estar signada pels dos progenitors.