

MANIOBRA RCP BÀSICA

PERSONA INCONSCIENT:

Demandar ajuda i telefonar el 112

OBRIR VIA AÈRIA I
COMPROVAR RESPIRACIÓ



RESPIRA
NORMAL

Posició
lateral de
seguretat

NO RESPIRA
NORMAL

RCP



Pacient
pediàtric

5 ventilacions
de rescat

15:2

Pacient adult

30:2

Només dispongam d'un DESA

Activar-lo i seguir instruccions

Descàrrega NO
indicada

Continuar
RCP

Descàrrega
indicada


1 descàrrega

Continuar
RCP




ON COL·LOCAR LES PEGATINES DEL DESA ?

*Població
adulta*



*Població
pediàtrica*


*(menors de
8 anys i/o
menys de 25 kg)*



Mai tocar a la persona mentre
s'està realitzant la descàrrega



PRIMERS AUXILIS



OBSTRUCCIÓ DE VIA AÈRIA

EN ADULTS,
LACTANTS I XIQUETS

Tos inefectiva

(no expulsa res)

INCONSCIENT

**5 ventilacions
Iniciar RCP**

CONSCIENT

**5 colps en l'esquena i
5 compresions
(Heimlich)**

**(Lactants, en el pit)
(> 1 any, abdomen)**

Tos efectiva

(expulsa saliva,
moc...)

**Animar a seguir
tossint**

**Comprovar
continuament que
no deteriora la tos**



ANAFILAXI

AUTOINJECTOR D'ADRENALINA

1-

Agafar autoinjector
amb mà dominant.
COM UN PUNYAL.



2-

Llevar tapó
protector.



3-

Pressionar en angle
recte en la cara antero-
lateral de la cuixa fins
escoltar **clic**.



4-

Mantenir 10 segons.



5-

Fer massatge en cercles
altres 10 segons.



6-

Telefonar al 112



7-

Si no respon, repetir
dosis en 5-15 minuts

**En cas de dubte
ADMINISTRAR ADRENALINA**

CONVULSIONS



- Demanar ajuda i telefonar al 112.
- Allunyar objectes del seu voltant .
- Afluixar roba/indumentària apretada.
- No intentar obrir la boca.
- **NO POSAR CAP OBJECTE DINS DE LA BOCA**
- Protegir el cap

DEIXAR CONVULSIONAR



Si és un xiquet@, prendre la
temperatura i intentar
refredar amb draps humits.

